



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

295034 г. Симферополь, ул. Титова, 71 тел/ факс (0652) 25-33-44

14 нояб 2025 г

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аметов Арсен Эмилевич, 13 лет (15.11.2011 г.р)
Республика Крым, [REDACTED]

Диагнозы:

Основной: C41.0 C, SMARCB1-дефицитная. Операция 06.05.22 (биопсия опухоли). Операция 20.06.22 (эндоскопическое трансанальное и трансоральное частичное удаление опухоли). Состояние после локальной протонной лучевой терапии до СОД 76Гр с 10.08.22 по 30.09.22. Динамическое наблюдение 8 месяцев. Локальный рецидив+системный рецидив (мтс в легкие, позвонок L3. ПХТ по протоколу EuroEwing2012(armB) с 26.08.23 (12 курсов). Прогрессия заболевания. ПХТ 2 линии (1 курс VIT) с 09.02.24. Прогрессия заболевания. Терапия 3 линии (гемцитабин\доцетаксел\бевацизумаб) с 03.03.24. Стабилизация заболевания (отмена в связи с токсичностью). Метрoномная ПХТ винорелбин\циклофосфамид с 18.12.24. Прогрессия заболевания от 22.02.25. Терапии 5 линии с 06.03.25 (гемцитабин\гидроксимочевина). Прогрессия. Терапия 6 линии: пазопаниб. Прогрессия. Терапия 7 линии: высокодозный ифосфамид.

Заключение: Ребенок с метастатической, многократно рецидивирующей низкодифференцированной хордoмой ската, в настоящее время получает 7 линию терапии (высокодозный ифосфамид). На фоне текущего режима терапии отмечается стабилизация заболевания, однако тип опухоли, эффект высокодозного ифосфамида ожидается непродолжительный. Стандартные варианты лечения в данном случае исчерпаны. В дальнейшем, в качестве терапии сдерживания может использоваться таргетная терапия: сорафениб + эверолимус.

Рекомендовано:

1. Продолжить противорецидивную терапию HD ифосфамид до прогрессии заболевания
2. Для сопровождения HD ифосфамид, показана Месна 60 флаконов по 400мг на 1 курс. Всего планируется 6 курсов.
3. После прогрессии заболевания или непереносимой токсичности, показана таргетная терапия сорафениб 200мг x2рд + эверолимус 5мг x1 рд.
Потребность на 1 мес лечения: сорафениб 60 таблеток по 200мг, эверолимус 30 таб по 5мг. Лечение проводится до прогрессии заболевания либо до развития непереносимой токсичности.

Врач-детский онколог: Сакум ДД



Сакун ДД