

ОГБУЗ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

г. Белгород

Министерство здравоохранения
Консультативно-диагностический центр

№ учреждения здравоохранения
«Детская областная
клиническая больница»

308036, г. Белгород, ул. Губкина, 44
Тел.: 55-43-64; факс: 55-14-34

24.02.2025 г. № 108

24.02.2025 г.

ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Консультация пульмонолога

Гр. Хохловских Ксения 2012 г рождения.

Находился /лась на амбулаторном посещении в поликлиническом отделении (КДЦ) «Детской Областной Клинической Больницы»

Диагноз: Муковисцидоз, легочно-кишечная форма, средне тяжелое течение. Хронический обструктивный бронхит. Правосторонние цилиндрические (единичные в верхней доле справа) бронхоэктазы. Субсегментарный ателектаз справа (SIV). Синдром мукостаза. ХДН 1ст. хронический риносинусит. Хроническая панкреатическая недостаточность, тяжелое течение. Холестатический гепатит, легкое течение. Фиброз печени.

Рекомендовано: Наблюдение педиатра по месту жительства.

1. Панкреатин капсулы в минимикросферах без метакриловой кислоты (креон) 10000ЕД 36капс/сут по индивидуальной схеме во время еды, постоянно. Учитывая, что у ребенка хроническая панкреатическая недостаточность тяжелой степени, показано применение Креона 10000ЕД в капсулах, где содержится оптимальное количество панкреатина и вспомогательных веществ. Препарат назначен по жизненным показаниям, по индивидуальной схеме лечения. Замене на другие панкреатин содержащие препараты не подлежит.
2. Урсодезоксихолевая кислота 500мг 4 капс в сутки - 2 капс утром + 2 капс на ночь в 19:00 - ежедневно, постоянно. Препарат назначен по жизненным показаниям.
3. Дорназа альфа 2,5мг 2,5мл 1 амп * 1 раз - ингаляционно, постоянно. Препарат назначен по жизненным показаниям.
4. Гипертонический раствор хлорида натрия 7% + гиалуроновая кислота 0,01% 5мл * 2 раза - ингаляционно, постоянно. Препарат назначен по жизненным показаниям.
5. Ацетилцистеин 200мг 1т * 3 раза - после еды, длительно, для улучшения отхождения мокроты. По жизненным показаниям.
6. В связи с высеивом синегнойной палочки ингаляционная терапия: Тобрамицин 300мг 4мл * 2 раза в день - 28дн(+) 28дн(-), чередовать с ингаляциями коллимистата натрия 2млн Ед (1фл) * 2 раза - 28дн(+) 28дн(-) 2 раза в год по 3 мес
7. Кинезитерапия ежедневно, постоянно.
8. Диета с обогащением колоража за счет белков и углеводов + дополнительное подсаливание, обильное питье + Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше одного год, для энтерального питания при муковисцидозе (жидкая стерилизованная смесь 200мл) 1 б в день - 30 б в мес. Продукт сухой специализированный для диетического лечебного питания детей старше года при муковисцидозе ("Нутридринк Нутризон Эдванс" 800гр) 12 банок/мес

Врач: Ковалева Н.В.

