

Выписной эпикриз № 1131/2401

Ткаченко Евгения Сергеевна, 2005 года рождения, находился на реабилитационном лечении с 17.11.2024г по 16.12.2024г

Диагнозы:

Основной диагноз: T91.3 Последствия ПСМТ от 22.01.2022г: компрессионно-оскольчатый перелом тела С6 позвонка, ушиб сдавление спинного мозга на уровне С6. Оперативное лечение от 29.01.2022г - декомпрессивная корпэктомия С6, герметизация ТМО, корпородез С5-С7 сетчатым кейджем Хармса с аутокостью, фиксация пластиной System 2. Верхний смешанный парализ, нижняя спастическая параплегия. НФТО по смешанному типу.

Осложнение основного заболевания: N31.8 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря. Хронический цистит, ремиссия.

Жалобы: на спастичу в ногах, нарушающая сон, "выталкивание" из кресла-коляски, на боли внизу живота

Анамнез заболевания: Собран со слов и по данным медицинской документации. 22.01.2022г в быту получила травму шейного отдела позвоночника с развитием тетрапареза. Бригада СМП была вызвана на следующие сутки. Выявлен положительный анализ SARS-CoV-2, в дальнейшем проходила лечение по в/у заболеванию. Ввиду усугубления дыхательных нарушений переведена в профильное учреждение, где выявлен компрессионно-оскольчатый перелом тела С6 позвонка, ушиб, сдавление спинного мозга на уровне С6. 29.01.2022г выполнено оперативное лечение - декомпрессивная корпэктомия С6, герметизация ТМО, корпородез С5-С7 сетчатым кейджем Хармса с аутокостью, фиксация пластиной System 2.

Неоднократно проходит курсы реабилитационного лечения в РЦ "Янтарь".

Госпитализирована в РЦ Преодоление впервые.

Хронические заболевания: Пролечен крестца 3 ст.

Аллергический анамнез: неотягощен

Перенесенные операции: 29.01.2022г - декомпрессивная корпэктомия С6, герметизация ТМО, корпородез С5-С7 сетчатым кейджем Хармса с аутокостью, фиксация пластиной System 2.

Трахеостома. Диагностическая лапароскопия на органы малого таза ввиду болевого синдрома.

Постоянно принимает: цистон, нейромидин курсами, фиталакс 2 ж. ч/день, микролакс 1 супп. ситуативно

Вредные привычки: отрицает.

Дополнительные сведения: туберкулез, гепатиты С и В и другие инфекционные заболевания отрицает. Контакты с инфекционными больными отрицает.

Эпидемиологический анамнез: Выезд за пределы РФ: нет; Контакты с инфекционными больными или носителями не было.

Студентка колледжа

Объективно: Состояние пациента удовлетворительное. Астенического телосложения, пониженного питания. Нормотермия. Кожные покровы обычной окраски и влажности. Послеоперационный рубец на шейном уровне самостоятелен, без признаков воспаления. Рубец после деканюляции. Дыхание самостоятельное, ритмичное, ЧД - 16/мин. Аускультативно дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Аускультативно тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС - 76/мин. АД - 100/65 мм.рт.ст. Слизистая ротовой полости, языка влажная, чистая. Живот мягкий, безболезненный, для глубокой пальпации доступен. Печень перкуторно по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Шумы перистальтики выслушиваются. Симптомов раздражения брюшины не выявлено. Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон. Интермиттирующая катетеризация 4р/сутки. Между катетеризациями отмечает самостоятельное мочеиспускание. Использует памперсы.

В неврологическом статусе: Сознание ясное. Общемозговых и менингеальных симптомов нет. Афазии, дизартрии нет. Эмоциональный фон ровный. ЧМН: Глазные щели и зрачки S= D. Острота зрения сохранена, снижена. Диплопии нет. За молоточном следит, произвольные движения глазных яблок в полном объеме. Гемипарез не определяется. Зрачки соответствует уровню освещения, фотореакции сохранены. Косоглазия нет. Корнеальный рефлекс живой. Нарушение чувствительности на лице нет. Лицо симметрично. Слух сохранен. Нистагма нет. Пареза мягкого неба нет. Глоточный рефлекс сохранен, с двух сторон. Симптомов орального автоматизма нет. Положение головы не нарушено, произвольные движения не ограничены. Язык по средней линии. Объем пассивных движений: ограничено отведение бедер и тыльное сгибание в г/ст суставах в связи со спастикой. Мышечная сила в руках и ногах: верхний смешанный парализ со снижением мышечной силы (справа/слева): сгибание плеча (С5-С6) 3/36., разгибание плеча (С6) 3/36., отведение плеча (С5-С6) 3/36., приведение плеча (С5-С6) 3/36., сгибание предплечья (С5-С6) 3/36., разгибание предплечья (С6) 2/26., сгибание кисти (С7) 2/26., разгибание кисти (С6) 2/26., сгибание пальцев (С7-С8) 0/06., разгибание пальцев (С7) 0/06., противопоставление большого пальца (С8/Th1) - 0/06, отведение большого пальца (С8/Th1) - 0/06, приведение большого пальца (С8/Th1) - 0/06, отведение 5 пальца (Th1) - 0/06, приведение 5 пальца - 0/06. Нижняя спастическая параплегия - 0/0 б. Повышение мышечного тонуса преимущественно в приводящих мышцах и мышц сгибателей бедра справа до 2-3б., в дистальных отделах ног - 1б. Глубокие рефлексы в руках живые и ногах живые, D=S. Нарушение поверхностной чувствительности по проводниковому типу с уровня С6, анестезия с уровня Т2. ПНП - выполняет в рамках пареза. ПКП - не выполняет. В пробе Ромберга не исследовалась. НФТО по смешанному типу, стул - склонность к запорам

Самостоятельно не присаживается, не пересаживается. Требуется помощь при осуществлении трансферов. Перемещается в кресле-коляске с ручным приводом самостоятельно. Обслуживает себя частично: требуется ассистенция при гигиенических процедурах, надевании верхней и нижней части

Эхогенность: средняя Сосудистый рисунок: не изменен Новообразования: не лоцируются Кисты: не лоцируются
Внутрипеченочные протоки не уплотнены, не расширены
Желчный пузырь: Не увеличен 4,6 x 1,5 см (8,0 x 3,0 см) Стенки: средней эхогенности, не утолщены 0,3 см (до 0,3 см)
Перегиб в области тела Конкременты: не лоцируются Полипы: не лоцируются Содержимое однородное Ductus choledochus
0,3 см (до 0,6 см) V. porta 0,9 см (до 1,2 см) V. cava inf. 1,4 см (до 2,0 см) V. llenalis 0,5 см (до 0,8 см)
Поджелудочная железа: головка: не увеличена 1,9 см (1,1 - 3,0 см) тело: не увеличено 1,2 см (0,5 - 2,0 см) хвост: не
увеличен 2,0 см (0,7 - 3,5 см) Контуры: ровные, четкие Структура: однородная Эхогенность: средняя Новообразования:
не лоцируются Кисты: не лоцируются
Селезенка: Не увеличена 8,7 x 4,0 см (12,0 x 5,0 см). Контуры: ровные, четкие Структура: однородная Эхогенность:
средняя СИ 12,6 (до 25 см.кв.)
Заключение: УЗИ-признаки деформации желчного пузыря
[28.11.2024] УЗИ органов забрюшинного пространства и малого таза: Почки: Расположены типично, подвижность в
пределах нормы Размеры не изменены: правая: 9,5 x 3,9 см, левая: 10,3 x 3,9 см (12,0 x 5,0 см) Кортико-медуллярная
дифференциация сохранена Контуры: ровные, четкие Структура паренхимы: однородная Толщина паренхимы: справа 1,7
см, слева 1,7 см Ч.Л.С. не расширена Конкременты: не лоцируются Новообразования не лоцируются Кисты: не
лоцируются Надпочечники: четко не лоцируются
Мочевой пузырь: Локализация: типичная Форма: округлая Стенки: ровные, не утолщены, не прерывистые Внутренний
контур четкий, ровный Содержимое однородно Конкременты: не лоцируются Дивертикулы: не лоцируются
Новообразования: не лоцируются Объем остаточной мочи 150* мл.
Заключение: Структурной патологии не выявлено

Консультирован врачом ФРМ: Показано:

Кинезотерапия индивидуальная №21
Механотерапия индивидуальная №21
Социально-бытовая реабилитация №10
Эрготерапия №9

Баланс-тренинг №9 - в плане лечения. С 25.11.24 занятия разрешены.
Занятия лечебной физкультурой с применением электромиостимуляции на все группы мышц №6
Занятия в зале ФПР №8 - в плане лечения, после тестирования на коляске активного типа
Под контролем АД и ЧСС!

План физиотерапевтического воздействия: Массаж лечебный классический №15 - для улучшения лимфо- и
кровообращения, нормализации мышечного тонуса.
Прессотерапия на нижние конечности №10 - для улучшения кровообращения, трофики, с лимфодренажной целью.
Аппликации озокерита на область кистей №11 - для улучшения трофики, кровообращения, обезболивания, уменьшения
спастичности, уменьшения скованности.

Консультирован урологом: Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря. Хронический цистит, ремиссия.
Противопоказаний к проведению реабилитационных мероприятий в настоящий момент нет.

1. При манифестации уроинфекции необходимо назначение антибактериальной терапии по посеву мочи
2. Питьевой режим не менее 2,5 л в сутки.
3. Везикар 10мг 1таб x 1раз в день

Проведено лечение: Перевязки и инъекции: Забор крови
Социально-бытовая реабилитация: Занятия по бытовой адаптации, Занятия с эрготерапевтом, Осмотр специалиста по
социально-бытовой адаптации
Восстановительная терапия: Баланс-тренинг, Кинезотерапия индивидуальная., Массаж классический, Механотерапия
индивидуальная

ФТЛ: Парафино-озокеритовые аппликации (2 зоны), Прессотерапия

Рекомендации по ТСР и средствам ухода: [18.11.2024] Корсет функционально-корректирующий - 1 шт

Аппарат на всю ногу; 2 шт

Аппарат на нижние конечности и туловище (параподиум) - 2 шт

Аппарат на коленный сустав 2 шт

Аппарат на голеностопный сустав 2 шт

Аппарат на голеностопный и коленный суставы 2 шт

Кресло-коляска с подголовником, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов), с аккумуляторной батареей, с
электрическим способом регулировки угла наклона спинки, сидения, подножки -1шт

Кресло-коляска активного типа - 1шт

Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 1 шт

Приспособление для надевания рубашек- 1 шт

Приспособление для надевания колгот- 1шт

Приспособление для надевания носков- 1шт

Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц - 1шт

Захват активный - 1 шт

Ортопедические брюки - 1 шт

Противопролежневая подушка воздушная - 1шт

Противопролежневый матрас воздушный (с компрессором)- 1шт

Ремонт технических средств реабилитации - 1 шт

Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке - 1шт

Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки - 1шт

Опора в кровать металлическая - 1 шт

Кресло-коляска с ручным приводом комнатная - 1шт

Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная - 1шт

Корсет полужесткой фиксации - 1шт

Корсет жесткой фиксации - 1шт

[06.12.2024] Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для
асептической самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия, тип нелатон, мужские, количество 6 штук в
сутки.

Абсорбирующее белье, подгузники - 3шт. в сутки