

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
КАЗАХСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  
БОЛЬНИЦА

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

и. С.Сталинского, 2 тел. 34-14-14  
Министерство здравоохранения  
СССР

наименование учреждения

Код формы по ОКУД \_\_\_\_\_  
Код учреждения по ОКПО \_\_\_\_\_

Медицинская документация  
Форма N 027/у

Утверждена Минздравом СССР  
04.10.80 г. N 1030

ВЫПИСКА

из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного  
(подчеркнуть)

В

название и адрес учреждения, куда направляется выписка

1. Фамилия, имя, отчество больного Алесеев Алишер

2. Дата рождения 04.05.2020

3. Домашний адрес

4. Что посещает УЧ

5. Даты: а) по амбулатории: заболевания \_\_\_\_\_  
направления в стационар \_\_\_\_\_  
б) по стационару: поступления \_\_\_\_\_  
выбытия \_\_\_\_\_

6. Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение)

Большутый перинатальный порок -  
ниж. кри. Задержка психо-речевого  
разв. Сенсорная алане  
супроводимость и речь не  
вспоминает.

7. Краткий анамнез заболевания, диагностические исследования, течение болезни,  
проведенное лечение, состояние при направлении

Ребенок от 1 года, проживающей на фронте  
госпитальной отрасли по причине из-за нее.  
Причины при рождении ЧДО, и роды  
стороннее родление по территории  
в 25 году прошли, что не характеризует  
их выше, кроме как их хроматокомбинации.  
Родился с 35 г. с патологичными  
формами, стала понимать не здор  
в 10-2024; улучшилось понимание речи  
получил курс -этаперации, когниции, эмоци  
ональные изменения, гипотония, психомоторные  
функции, нарашивание лечения. Продолжал  
каждые томографии, в 2022 в ходе дальнейшего  
рода он скончался на 3-м году из-за осложнений  
из-за пневмонии, засухи, сенсорной алане  
супроводимости, нарашивание лечения. Продолжал  
продолжаться исходя из





**КОНСУЛЬТАЦИЯ  
врача-невролога**

**ФИО: Лисицин Богдан Алексеевич**  
**Д.р.(возраст): 04.05.2020г**

**Дата консультации: 17.08.2025г.**

**Жалобы:**

на нарушение психо-речевого развития — активная словесная речь не сформирована, нечеткое звукопроизношение, понимание ограничено на бытовом уровне.

**Данные анамнеза:**

Ребенок от IV беременности, протекавшей на фоне частичной отслойки плаценты на 9 неделе. I беременность была замершой.

Роды на 39 неделе, естественные. Вес при рождении — 4200г. Оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. Адаптационный период и ранний неонатальный период протекали без особенностей.

Моторное и физическое развитие на 1 году жизни протекало в соответствии с возрастом. Речевое развитие с задержкой, более явно проявилось после 1.5-2 лет.

Профилактические прививки проводились: проводилась вакцинация только БЦЖ, ККП и против НВВ.

Судорожных и других пароксизмальных состояний в анамнезе не было.

**Проведены исследования:**

ЭЭГ сна (06.2025г) — Эпилептиформной активности не выявлено.

ЭЛИ-Нейро-Тест12 (2025г) —

аAm к кальц.каналам: +32%  
аAm к холин.рц: +19%  
аAm к серотон.рц: +15%  
аAm к эндорфину: -20%

NSE – 24 нг/мл

S100 – 0.110 мкг/л

Лактат крови – 3.3 ммоль/л

Биохимический анализ крови – без клинически значимых изменений

OAK – эритроцитоз, повышение уровня гемоглобина и гематокрита, эозинофилия 11.7%

ПЦР к вирусам герпетической группы (кровь, моча) – не обнаружены

ПЦР (паразиты) – не выявлено

Газовая хромато-масс-спектрометрия по Осипову – признаки угнетения пролиферации лактобактерий, бифидобактерий; избыточная пролиферация условно-патогенной микрофлоры (в том числе грибковой).

Гормональный профиль щитовидной железы – без изменений

IgE total 520 МЕ/мл

Витамин D - 62 нг/мл

Ранее проводилось нейрометаболическое лечение, 3 курса МТРТ, БАК, Tomatis, педагогическая коррекция.

**Клинический диагноз: Нарушение психоречевого развития по типу преимущественно моторной азалии, ОНР I.**

**Дисбактериоз кишечника.**

## **Рекомендовано:**

### **1.**

Занятия с логопедом-дефектологом, психологом (нейропсихологом)  
(основные направления, которые можно использовать сейчас или в будущем)

- Развитие высших психических процессов с помощью развивающих игр.
- Методика Грузиновой по развитию речи
- Использование гарнитуры Forbrain®  
<https://www.forbrain.com/ru>
- Глагольный тренинг (С группой предметов выполнять определённые действия, давая инструкцию. Например, молоток - стучи, барабан - бей, мяч - кати, сквиш - дави, кнопка - жми ит.п. Сначала – два предмета, затем – увеличивать количество предметов и инструкций. Развитие слухо-речевой памяти – «Сначала стучи, затем сырь» и т.п. Усложнение задания - инструкция «Сначала стучи молотком, затем – ложкой».)
- Нейродинамическая и сенсомоторная коррекция (В.С.Колганова, Е.В.Пивоварова «Нейропсихологические занятия с детьми 3-12 лет» \ Семенович А.В. "Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза".)
- Н.С. Четверушкина «Слоговая структура слова», С.Е. Большакова «Формируем слоговую структуру слова» и др.
- Коррекция произвольной моторной программы (выкладывая из ортопедических ковриков дорожку, шагать + выполнять движение, выкладывать визуально-ритмический ряд в линию, в столбик, по кругу. Предметы чередовать 1:1 (треугольник-круг-треугольник – круг – и т.д. до 10), совмещая при этом движения и слоги. Затем – 1:1:1, далее 2:1)
- Развитие схемы тела, изучение направлений движения, предлогов.
- Развитие когнитивных процессов (лабиринты, мемори на развитие памяти, Анна Белошистая «Первые шаги к интеллекту 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет. Развивающие задания для детей»)
- Активизация речевого механизма, налаживание системы ритма и такта, фонематического восприятия слов посредством методики Т.Н. Новиковой-Иванцовой «Ритмы. Слоги».
- Логопедический массаж
- Развитие соматогнозиса (ребёнок закрывает глаза, родитель дотрагивается до определённой части тела малыша. Ребёнок, открыв глаза, указывает, до какой части тела дотронулся родитель. Затем усложнение – показать на две части тела. Игра в «Зеркало» - на макете человечка выстроить позу, ребёнок повторяет данную позу)

### **2.**

#### **Протокол коррекции работы желудочно-кишечного тракта**

##### **Диета**

- В сутки питание должно быть 4х-разовым, избегать перекусов
- Между приемами пищи, а также утром при пробуждении пить очищенную бутилированную некипяченую воду – не менее 1/3 стакана.
- Ограничить глютен, подсолнечное растительное масло заменить на оливковое, исключить дрожжи, сахар и продукты его содержащие (сахарозаменители), виноград, переспелые бананы.

#### **1 ЭТАП**

##### **в течение 1 недели:**

Любой сорбент - например, **Сорбент Аквион Жидкий уголь для детей** или **Энтеросгель** или **Фильтрум Сти**

*Другие препараты, принимаемые в эти же дни, назначаются за 1 час до или через 1,5-2 часа после данного препарата  
в возрастной дозировке*

**Энтеросгель** (паста для приема внутрь, 225г). 2 чайные ложки утром, 3 чайные ложки днем и 2 чайные ложки вечером. Принимается за 1 час до еды или 2 часа после еды, запивается достаточным количеством воды или возможно растворить в ½ стакане теплой кипяченой воды.  
или

**Фильтрум-сти** (400мг в 1 таб) Препарат следует принимать внутрь, желательно после

предварительного измельчения, запивая водой, за 1 ч до еды. Принимать по 1 таб 3 раза в сутки.

или

**Аквион жидкий уголь** – принимать по 2 пакетика, разделенным на 3 приема.

При появлении запора на данном этапе лечения добавить препарат:

**Форлакс (Forlax)** (в 1 пакетике 10г) – принимать по 1 пакетику 1 раз в день утром

## 2 ЭТАП:

перед завтраком **Минеральная вода Donat Mg (Донат Магний)** – 40-50мл (1 стопка) или Боржоми (наливь заранее, чтобы вышли газы).

После минеральной воды – 40-50мл **настоя семян льна** (за 30минут до приема 2 чайные ложки залить кипятком, настоять, затем растереть семена, процедить и выпить) - 30 дней

Препараты вводить поэтапно, через каждые 2 – 4 дня от начала приема предыдущего

+

после завтрака и ужина - **Альфа Нормикс (Alfa Normix, Рифаксимин)** (200мг в 1 таб. /или/ 100мг в 5 мл супензии) принимать по 100мг утром и 100мг вечером – 7 дней

-на 5й, 6й и 7й день Альфа Нормикса дополнить приемом препарата: **Флюконазол (150мг в 1 капсуле)** – по 1/3 в день – 3 дня приема (через 1 неделю прием из трех раз повторить)

+

Любой пробиотик, например

**Enterogermina или Линекс для детей или Аципол или Нормофлорин Л и Б или Трилакт + БифидумБаг или**

**LactoBif**, пробиотики, 5 млрд КОЕ – принимать 1 шт. 2 раза в день во время еды – 1,5 месяца

При отрицательной реакции (очень жидкий стул, выраженные нарушения поведения, заменить на другой пробиотик, например безмолочный:

Пробиотик **D-Lactate Free Probiotics Powder**

Начните с 1/2 детской мерной ложки (0,1 грамма, 25 миллиардов КОЕ) порошка утром натощак. Растворите порошок в стакане воды и выпейте. Оставайтесь на этой дозировке примерно 3-5 дней. Далее увеличить до 1 мерной ложки 2 раза в день. Курс 1,5 месяца.

+ во время обеда - **Масло черного тмина 3 капли + Цитросент экстракт семян грейпфрута (20 мл флакон) 3 капли** (растворить в напитке или добавить в еду)- 30 дней

+

во время обеда и/или ужина - Пищеварительные ферменты, например

**Креон (аналоги Эрмиталь, Микразим)** 1/2 капсулы 2-3 раза в день ( в 1 капсуле 10 т.ед.), с приемами пищи (в обед и ужин). Курс 30 дней.

или

**Enzymedica, GlutenEase** принимать 1 капсулу в день (разделить на 2-3 приема пищи. Курс 2 месяца

*Эффективно расщепляет глютен и казеин. Защищает при употреблении блюд со скрытым содержанием глютена*

+

**Стимол или Цитруллин ¼-1/3 пакетика** в течение 30 дней. Принимать во время еды, растворив в небольшом количестве воды.

## 3 ЭТАП

*После окончания стимола*

+ **ГепАМерц или Орнитин** (пакетики с порошком) – по ¼-1/3 пакетика растворенного в 50 мл жидкости – 30 дней (

*Сразу после окончания приема пробиотика:*

**Daigo/Lactis** (Япония) начать с 1 мл в день, дозировку возможно увеличить до 4 мл – курс 2 мес или

**Актофлор Solopharm или Метабиотик Т8 Mobio** 1 мл 1 раз в день, возможно увеличить до 4 мл. Принимать в течение 2 мес

### **3.**

#### **Дополнение к рациону питания**

*совместно с препаратами пункта №2,4,5*

*Чередование курсов: 1 месяц омега 3, затем 1 месяц фосфолипиды (4 цикла)*

**Omega3** любой препарат в возрастной дозировке

например,

**Omega 3 Möller** жевательные рыбки – 2 пастилки в день во время еды, курс 1 мес или **Nordic omega3** или **Efalex** – по 2,5 мл 2 раза в день во время еды, курс 1 мес

*после омега 3 – фосфолипиды:*

**Alpha GPC** принимать во время еды по 1/2 в день в течение 1 месяца

или

**Phospholipid Complex BodyBio PC Liquid 4oz(120ml)** – принимать по 2,5 мл в день в течение 1 месяца

*+совместно с фосфолипидами **Myelin D- biotin NAD** – принимать по 1/2 в день (или заменить на комбинацию двух препаратов **Биотин+ NADH** 1/3 от взрослой дозировки)*

*+ зимой прием витамина **D+K2** 1500МЕ в день*

*В октябре-ноябре, феврале-марте*

**ASDhelp Speech essentials improved** принимать по ½ капсуле в течение 2 месяцев (при нормальной реакции на препарат дозировку увеличить до 1 в день)

*4 курса (сентябрь, ноябрь, февраль, май)*

**MITOboost ASD Help supplements или Mitotherapy capsule formula Klare Labs или MITO REGEN** принимать по 1/2 капсулы в день. Курс 1 месяц

### **4.**

С 23 сентября курс **аудиовокальной стимуляции Tomatis**

#### *Примечание:*

- в первые 2 дня все назначенные препараты принимаются в половинной дозировке
- в случае появления выраженной возбудимости, эмоциональности, гиперактивности, нарушении сна, дозировку следует уменьшить вдвое или втрой и принимать маленькую дозировку до конца курса
- в случае появления аллергической реакции или сохранения выраженной эмоциональной возбудимости, необходимо полностью отменить препарат, сделать перерыв 1-3 недели и перейти на следующий этап лечения
- в случае заболевания ОРВИ, сопровождаемого температурой выше 38 С, временно приостановить лечение
- препараты, которые имеют капсулную форму выпуска, можно извлекать и добавлять в пищу или напиток
- если в протоколе лечения указано несколько аналогичных препаратов .... «или»..., разницы нет, какой вы выберете
- если в протоколе лечения указана пометка – «через 1 неделю начать...», это значит, что прием следующего препарата вы можете начать не ранее 1 недели после предыдущего. Максимальный же срок может быть 2,3 и даже 4 недели, если это будет необходимо (например, чтобы получить какое-либо другое лечение, аппаратные методики, обколки и тд или вы просто хотите «отдохнуть» от лекарств). Если же указано – «после начать препарат», это значит, что последующий препарат вы можете начать сразу после предыдущего или сделать перерыв 1-4 недели и далее продолжить лечение. Если указано «сразу после», то это значит, что лечение нужно начать сразу без перерыва.

## **5.**

*После завершения курса Tomatis*

**PEA Palmitoylethanolamide** или **Normast** (600мг)

Принимать по ¼ в день в течение 4-7 дней,

затем при нормальной реакции на препарат дозировку увеличить до ½ в день.

Курс в течение 5 недель

При эмоциональной возбудимости оставить дозировку препарата ¼ в день.

*Через 1 неделю дополнить лечение препаратом:*

**5-LOX Inhibitor** (в 1 капсуле 100мг) принимать содержимое ½ капсулы 1 раз в день после обеда (возможно растворить в небольшом кол-ве жидкости) – курс 5 недель. При появлении жидкого стула отменить препарат.

*После окончания курса PEA или Normast*

**Корилип** (свечи «25+2+12мг») – по 1 свече в день. Длительность курса лечения - 10 дней. Через 20 дней курс повторить (2 курса)

## **6**

*После окончания курса PEA (или добавить к PEA, но не ранее, чем через 3 недели от начала ее приема)*

**Нейрометаболическое лечение, стимулирующее речевое и умственное развитие:**

**Researched Nutritionals BDNF Essentials Neuroplasticity**

принимать по 1/3 в день в течение 20 дней (при нормальной реакции на препарат дозировку возможно увеличить до 1/2 в день), через 30 дней курс повторить (4 курса)

Или препарат возможно заменить на **Guna BDNF** (30ml/1.0 fl.oz. 30%) 3 капли 2 раза в день – 20 дней (при нормальной реакции на препарат дозировку возможно увеличить до 5 капель 2 раза в день), через 30 дней курс повторить (4 курса)

*Междуд 1 и 2 курсами BDNF*

**Tricortin 1000** – (12 mg+1mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare)

Внутримышечно 1,5 мл – 3 раза в неделю – 10 инъекций

+передовать с препаратом

**Нейротрофический фактор Mouse Nerve Growth Factor for Injection (9000U)**

содержимое флакончика растворить в 1,5 мл физ.раствора, препарат вводится внутримышечно по 1,5 мл через день 10 инъекций\_

*Междуд 2 и 3 курсами BDNF*

**Детский сироп для интеллекта Xiao er Zhili Tangjiang СЯОЭР ЧЖИЛИ**

Принимать по 10 мл 2 раза в день в течение 4 дней, затем при нормальной реакции на препарат дозировку возможно увеличить по 15 мл 2 раза в день в течение 4 недель

### *Междур 3 и 4 курсами BDNF*

Инъекционный курс **моносиалового ганглиозида** Monosialotetrahexosylganglioside Sodium Injection (GM1) 2 мл внутримышечно ежедневно или через день – 15 инъекций  
чредовать препарат с

**Nucleo C.M.P. Forte** внутримышечно 3 раза в неделю по 1 ампуле (1 ампула лиофилизата растворяется в 1 ампуле растворителя из упаковки, в результате получается 2 мл раствора). Курс 9 инъекций

*Сразу после окончания ганглиозида во время четвертого курса BDNF повторить:*

**Нейротрофический фактор** Mouse Nerve Growth Factor for Injection (9000U)

содержимое флакончика растворить в 1,5 мл физ. раствора, препарат вводится внутримышечно по 1,5 мл через день или ежедневно 10 инъекций.

*Через 2-3 недели после четвёртого курса BDNF*

**Церебрум регио моторика - Cerebrum Regio Motor D 5**

(раствор в ампулах по 1мл №10) – внутримышечно по 1 мл 2 раза в неделю (понедельник, четверг) – 10 инъекций

+

**Плацента композитум** 1 мл внутримышечно 1 раз в неделю (вторник) - 5 инъекций

+

**Убихинон композитум** 1 мл внутримышечно 1 раз в неделю (пятница) - 5 инъекций

## 7.

**Курс аппаратных методик лечения, стимулирующих речевое и умственное развитие**

Процедуры проводятся отдельно от медикаментозного лечения (между приемом препаратов и аппаратными процедурами интервал 7-10 дней), далее медикаментозный курс необходимо продолжить через 1 неделю после окончания аппаратных методик лечения.  
Также аппаратные методики лечения возможно провести и после окончания всего медикаментозного курса.

*Не ранее декабря 2025г*

Курс **транскраниальной микрополяризации** по программе «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 10-12 процедур

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, г.Санкт-Петербург

ул.Бехтерева, 3  
тел. +7 812 670-02-20

или

<https://almadeya.ru/centr-neurologii/mikropolyarizaciya-golovnogo-mozga/>

После проведенного курса (возможно?) - **Лаеник** (Р-р д/инъекц. 112 мг/2 мл: амп. 10 шт.) внутримышечно по 1,5 мл 1 раз в неделю – 5 инъекций

Врач-невролог, нейрофизиолог  
высшей категории, к.м.н.:



Пичугов Д.Г.

Информация по заказу препаратов – WhatsApp +79023141699